

## Kysymyksiä ja vastauksia

Klikkaa vastaus haluamaasi kysymykseen!



Mistä kurkkukipu johtuu?

Kurkkukipu johtuu usein vilustumisen, rauhaskuumeen tai nielurisetulehduksen aiheuttamasta infektiosta. Kurkkukipu on yleensä virusinfektion aiheuttama. Antibiootit ja bakteerien kasvua estävät lääkkeet tehoavat vain, jos tulehduksen aiheuttajana ovat bakteerit. Virusinfektio paranee itsestään. Elimistö reagoi infektiioon tulehduksella. Yleisimmät oireet ovat turvotus, punoitus, kipu, lämmön tunne ja kuume. Kurkkukipu kestää tavallisesti muutamasta päivästä jopa viikkoon. Useimmat meistä kärsivät kurkkukivusta muutaman kerran vuodessa.



Miten Zyx auttaa?

Zyxin käyttöaihe on suun ja nielun kivun sekä ärsytyksen lievittäminen. Zyx lievittää paikallisesti kipua, koska sillä on puuduttava vaikutus suussa ja kurkussa.



Auttaako Zyx muuhun kuin kurkkukipuun?

Zyx lievittää kipua ja ärsytystä suussa ja kurkussa.



Mitkä ovat Zyxin pakkauskoot ja makuvaihtoehdot?

Pakkauskoot: 20 tabletin pakkaus.

Makuvaihtoehdot: minttu ja sitruuna.



Kuinka hoidan itseäni Zyx-imeskelytableteilla?

Zyx on 3 mg imeskelytabletti. Yksi tabletti voidaan ottaa 3 kertaa vuorokaudessa. Hoitoa ei saa jatkaa pidempään kuin 7 vuorokautta. Jos Zyx ei auta kurkkukipuun 3 päivässä, ota yhteyttä lääkäriin (jotta kurkkukivun syy saadaan selville). Parhaimman tuloksen aikaansaamiseksi anna tabletin liueta hitaasti suussa. Zyxin lääke muodon vuoksi tablettia ei saa antaa alle 6-vuotiaille lapsille (pienet lapset eivät aina pysty imeskelemään tablettia ja tabletti voi juuttua kiinni lapsen kurkkuun, jos se niellään). 6-11-vuotiaille lapsille tabletti voi antaa aikuisen valvonnassa, jolloin varmistetaan imeskelytabletin turvallinen käyttötapa.



### Mikä on Zyxin vaikuttava aine?

Vaikuttava aine on 3 mg bentsydamiinihydrokloridia (vastaten 2,68 mg bentsydamiinia) tabletissa. Se on paikallisesti vaikuttava tulehduskipulääke, jolla on kipua lievittävä ja paikallisesti puuduttava ominaisuus. Zyx antaa sekä nopean että tehokkaan kivunlievityksen ja lääkkeellä on myös tulehdusta vähentävä vaikutus. Zyx vaikuttaa ainoastaan paikallisesti. Lääkeainetta imeytyy verenkiertoon vähän, joten Zyxillä ei juurikaan ole vaikutusta muualle elimistöön.



### Mitkä ovat käyttöön liittyvät varotoimet ja varoitukset?

- Joillakin harvoilla potilailla suun/nielun haavaumat voivat johtua vakavasta sairaudesta. Jos oireet eivät lieviy 3 vuorokauden kuluessa, tulee ottaa yhteys lääkäriin tai hammaslääkäriin.
- Zyx sisältää aspartaamia (makeutusaine), joka on fenyyialaniinin lähde ja voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria.
- Zyx sisältää isomaltoosia. Jos sinulla on harvinainen, perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin käytä Zyxia.
- Jos olet yliherkkä salisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille, ole varovainen Zyxin käytön suhteen.
- Jos sinulla on astma tai on ollut astma, älä käytä Zyxia, koska lääke voi aiheuttaa kurkunpään kouristuksia.



### Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.



### Voiko Zyxia käyttää raskauden ja imetyksen aikana?

Ei, koska ei ole riittävästi tutkimustietoa.



### Mitkä ovat Zyxin haittavaikutukset?

Zyx on hyvin siedetty ja aiheuttaa haittavaikutuksia melko harvoin.

Melko harvinainen (>1/1000, <1/100 potilaista):

valoyliherkkyys (voimakas punoitus/ihereaktio auringonvalon vaikutuksesta)

Harvinainen (>1/10.000, <1/1000 potilaista):

Suun kirvely ja kuivuminen

Yliherkkyysoireet

Hyvin harvinainen (<1/10.000 potilaista):

Laryngospasmi (äänihuulten kouristus)

Angioedeema (nestemäinen turvotus)



Mitkä ovat yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset?

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Imeytyminen verenkiertoon on vähäistä. Vain noin 10% lääkeaineesta imeytyy verenkiertoon. Näin ollen yhteisvaikutuksen riski muiden lääkevalmisteiden kanssa on vähäinen.



Kuinka yleisesti käytetty bentsydamiini on?

Vaikuttavaa ainetta bentsydamiinia on käytetty 1960-luvulta lähtien

Italiassa rekisteröitiin vuonna 1976 bentsydamiinia sisältävät reseptilääkkeet ja vuonna 1982 ne rekisteröitiin itsehoitovalmisteeksi. Bentsydamiinia on siitä lähtien käytetty monissa maissa (esim. Englannissa, Irlannissa, Espanjassa, Portugalissa, Hollannissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa Seelannissa, Argentiinassa, Brasiliassa ja mm. Chilessä).



Voiko Zyx-tabletteja käyttää yhtäaikaaisesti muiden kipulääkkeiden kanssa?

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Imeytyminen verenkiertoon on vähäistä. Vain noin 10% lääkeaineesta imeytyy verenkiertoon. Näin ollen yhteisvaikutuksen riski muiden lääkevalmisteiden kanssa on vähäinen.



Voiko Zyx-tabletteja ottaa antibioottien kanssa?

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Imeytyminen verenkiertoon on vähäistä. Vain noin 10% lääkeaineesta imeytyy verenkiertoon. Näin ollen yhteisvaikutuksen riski muiden lääkevalmisteiden kanssa on vähäinen.



## Mitä tapahtuu, jos nielee Zyx-tabletin?

Jos Zyx-imeskelytabletin nielee, ei tabletti tehoa kurkkukipuun.

---

### Lähteet:

1. Zyx-valmisteyhteenveto
2. Pharmacokinetics of Benzydamine. *Int.J.Tiss. Reac.* VII (3) 195-204 (1985). Chasseaud L.F., Catanese B
3. Topical Anaesthetic Activity of Benzydamine. S. Simard-Savoie and D. Forest. Department of Stomatology, University of Montreal.
4. Savoie and Forest, 1978; Topical anaesthetic activity of Benzydamine